

Medikamentenplan

| Name: | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------|
| Vorname: | | | | |
| Geburtsdatum: | | | | |
| Medikament | morgens | mittags | abends | Zur Nacht |
| (z.B. Aspirin 100 | 1 Tbl. | 0 Tbl. | 0 Tbl. | 0 Tbl.) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Bitte beachten Sie!!!

Einige Medikamente dürfen vor Operationen nicht eingenommen werden, da z. B. die Blutgerinnung bzw. die Blutplättchen beeinträchtigt werden und es daher zu Nachblutungen kommen könnte. Folgende Medikamente müssen in einem zeitlichen Abstand zur Operation abgesetzt werden - wenden Sie sich dazu bitte rechtzeitig an ihren behandelnden Arzt.

10 Tage vor der geplanten Operation kein **Ticlopidin** (z.B. Desitic® Tiklopidin® oder Tyklid®) oder **Clopidogrel** (z.B. Iscover®, Plavix®)

4 Tage vor OP keine **acetylsalicylsäurehaltigen** Präparate (z.B. Acesal®, ASS®, Aspirin®, Godamed®, Miniasal®, Togal®, Thomapyrin®) mehr einnehmen

2 Tage vor Aufnahme absetzen: **Metformin** (z.B. Glucophage®, Metformin®, Siofor®, Thiabet®)

1 Tag vor geplanter Operation absetzen: **Nichtsteroidale Antiphlogistika**

Marcumar® oder Falthrom® **müssen in Absprache** mit Ihrem behandelnden Arzt durch Heparin ersetzt werden. Nur in wenigen Situationen können Marcumar oder Falithrom pausiert werden.